

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

DLP - 9 - 5 - 69 924744

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION de la STATION "AQUITAINE" (Tél. 92.06.25 et 92.26.94)

ABONNEMENT ANNUEL

GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE,  
LANDES, BASSES-PYRÉNÉES, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME

Sous-Régisseur d'Avances et de Recettes, Direction Départementale de l'Agriculture  
Chemin d'Artigues, 33 - CENON  
C. C. P. : BORDEAUX 6702-46

25 F.

Supplément N° 1 au Bulletin Technique N° 104 de Mai 1969

1969-12

## AVERTISSEMENTS

## ARBRES FRUITIERS

Tavelures des Poiriers et des Pommiers - Des attaques risquent à nouveau de se produire dans cette période de chevauchement entre les contaminations primaires et secondaires.

Il convient donc d'effectuer un nouveau traitement dès réception de cette note.

Araignées Rouges - Les éclosions se poursuivent dans les régions fruitières des vallées de la Garonne, de la Dordogne et du Lot.

Traiter avec des acaricides spécifiques dans les vergers où les pullulations larvaires dépassent, comme nous l'avons indiqué dans notre précédent bulletin, 8 à 10 acariens par feuille.

Proscrire les insecticides systémiques en raison de la résistance des acariens à ces produits.

## INFORMATIONS

Bactériose du Noyer - Après un départ tardif, la végétation des Noyers devient active et il faut envisager la protection des jeunes pousses et des chatons contre la Bactériose.

Un traitement avec un produit cuprique à 150 gr. de cuivre métal par hectolitre devrait être appliqué dès à présent.

## VIGNE

Mildiou - Il n'y a pas lieu d'envisager de traitement spécial contre le Mildiou actuellement, mais nous conseillons de faciliter l'écoulement de l'eau au bout des sillons et de supprimer toutes les pousses basses le long des ceps.

Oïdium - Les premières manifestations de la maladie viennent d'être observées sur des ceps très atteints l'année dernière.

Les viticulteurs doivent donc surveiller les foyers de 1968 et intervenir, s'il y a lieu, dès l'apparition des premiers symptômes.

## AVERTISSEMENTS

Araignées Rouges (Panonychus Ummi) - Les éclosions sont massives dans les foyers habituels de l'araignée rouge (Médoc, Charentes, Dordogne, Saint Emilion ....).

En conséquence, appliquer dans les prochains jours une pulvérisation acaricide soignée. Les acariens étant protégés par la pubescence abondante des jeunes feuilles de certains cépages, préférer pour ce traitement les insecticides systémiques aux acaricides de contact.

Bordeaux, le 5 Mai 1969

Le Contrôleur  
chargé des Avertissements  
C. ROUSSEL

L'Inspecteur  
de la Protection des Végétaux  
J. BRUNETEAU

Imprimerie de la Station de Bordeaux - Directeur Gérant : L. BOUYX

P 339